

◇ 登園してはいけない病気一覧 ◇

病名	潜伏期	症状	伝染期間	出席停止基準
麻疹	10~12日	発熱、上気道炎、目のカタル症状－解熱－再発熱、発疹	カタル期から発疹消失後5日	解熱後3日
風疹	14~21日	発熱、発疹、リンパ節腫脹	発疹前後1週間くらい	発疹が消えるまで
水痘	10~20日	発熱、発疹がほぼ同時に出現。丘疹－水ほう－かさぶた	発疹の1日前から発疹出現後7日	すべての発疹が、かさぶたになるまで
流行性耳下腺炎	14~24日	発熱、悪寒、頭痛、1~2日後に耳下腺が腫れる	症状を示す1週間前から9日間	耳下腺の腫れが消えるまで
咽頭結膜炎	2~7日	発熱、悪寒、結膜炎	潜伏期後半から症状消失まで	主要症状が消えてから2日
インフルエンザ	1~3日	突然の発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、咽頭痛、咳	症状出現後3日	解熱後2日
百日ぜき	1~14日	風邪症状から、ヒューヒューと特有のノド鳴りの症状	カタル期から4週間	特有の咳が消えるまで
ヘルパンギーナ	3~5日	発熱、咽頭痛、口腔内に小水疱ができ、潰瘍となる	急性期から数週間は糞便中に存在	主要症状が消えるまで
流行性角結膜炎	5~7日	目やに、充血、発熱	急性期間中	急性期炎症症状が消えるまで
溶連菌感染症	2~5日	高熱後、首、胸、下肢の股に淡紅色の発疹		主要症状が消えるまで
伝染性下痢症	2~4日	下痢、吐き気、おう吐、腹痛	症状のある限り	主要症状が消えるまで
伝染性軟属腫(水いぼ)		身体、手足に小結節。強くつまむと粥状物質排出	自己接触により多発	活動最盛期
伝染性膿痂症(とびひ)		米粒大の水疱－破れてジクジク－かさぶたできる	水疱からの滲出液で次々ととびひする	活動期の場合(軽症治療中の場合は可)
手足口病	3~5日	手のひら、足の裏、口の中に小さい水疱	発疹出現前日から1週間	主治医の判断によるものとする
伝染性紅斑(りんご病)	10~20日	紅斑は蝶のような形。口の周りには出ない		主治医の裁量に任せる